



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

®

Edition
Cultures Spéciales

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Jo + P
REGION CENTRE

SUPPLEMENT N° 48 AU BULLETIN TECHNIQUE N° 27

6 Septembre 1994

- EDITION CULTURES LEGUMIERES 25 -

ASPERGE	: Criocères : Reprise d'activité des larves.
CAROTTE	: Alternaria : Danger.
CHOU	: Nombreuses chenilles. Puceron cendré : En progression.
LAITUE	: Nombreuses chenilles. Mildiou : En pleine activité.
TOUTES CULTURES	: Risque Mildiou et maladies du feuillage en général.
INFO FLASH	

ASPERGE

Criocères :

Reprise d'activité de larves (37). Dans les seuls cas où ces ravageurs sont observés, un traitement est à envisager car le Botrytis peut s'installer sur les parties de ramifications endommagées.

Spécialités à base :

- de pyrèthrinoides (DECIS, KARATE, SUMI ALPHA, BAYTHROID, TALSTAR Flo),
- de roténone (CUBEROL V),
- d'endosulfan (THIODAN 35 CE),
- de carbaryl (SEVIN L 85),
- ou de chlorfenvinphos (BIRLANE CE 40).

Stemphyliose :

Les attaques de Stemphyliose sont plus importantes cette année que celles de la Rouille et les conditions climatiques actuelles risquent de favoriser ces maladies.

Dès le retour à des conditions plus sèches, utilisez une spécialité efficace contre ces deux champignons :

- SCORE,
- GANA,
- ou produits renfermant du manèbe.

Le chlorothalonil (exemple : ORZIN LEGUMES), très intéressant sur Stemphyliose, présente un certain effet également sur Rouille.

CAROTTE

Alternaria :

En raison des pluies de ces derniers jours, le développement de l'Alternaria est à craindre, surtout dans les cultures en phase de grossissement racinaire ou jeunes cultures. Si la dernière protection remonte à plus de 15 jours, réalisez une application avec ROVRAL AQUA Flo à 1,5 l/ha ou ANVIL LIQUIDE à 0,8 l/ha.

CHOU

Chenilles et pucerons cendrés :

* La présence de chenilles de Piéride et Noctuelles défoliatrices est observée dans de nombreuses plantations (dans certaines cultures, 30 à 100 % des choux atteints). De jeunes chenilles apparaissent encore (à la face inférieure des feuilles).

* La colonisation d'automne par les Pucerons cendrés commence (10 % de plantes présentant une colonie en Seine et Marne).

De nombreuses spécialités sont utilisables (autorisées) pour lutter contre chacun de ces ravageurs, mais il est recommandé de choisir celles présentant une efficacité multiple :

⇒ En présence de Pucerons et Chenilles :

- DECIS B ou DECIS QUICK à 0,5 l/ha,
- BEST à 1,5 l/ha,
- KARATE K ou OPEN à 1,5 l/ha.



direction régionale de l'agriculture et de la forêt

ARBORICULTURE : 250 F
VITICULTURE : 220 F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex



⇒ En cas d'absence de Pucerons cendrés, il est possible d'utiliser :

- TALSTAR à 0,2 l/ha,
- DECIS PEARL ou SPLIT à 0,3 l/ha,
- FASTAC à 0,2 l/ha.

Ces spécialités sont également efficaces contre Piérides et Noctuelles défoliatrices.

⇒ En l'absence de Chenilles, utilisez un aphicide :

- ORTHENE 50 à 1,5 kg,
- CRONETON à 1 l/ha,
- LANNATE ou METOVER à 1,25 kg/ha,
- ou une spécialité à base de phosalone ou endosulfan.

Thrips et Punaises :

Ils sont également observés, mais une intervention spécifique n'est pas nécessaire et les préconisations conseillées dans la lutte contre les chenilles peuvent réduire leur activité.

LAITUE

Pucerons :

Lente reprise des attaques de Pucerons.
En raison de la présence de nombreuses Noctuelles, préférez un produit efficace contre les deux ravageurs : ORTHENE 50; DECIS ou KARATE.

Mildiou :

Le Mildiou connaît actuellement un développement plus rapide compte-tenu des conditions climatiques. Veillez à une protection efficace jusqu'au stade "16 feuilles".

INFO FLASH

Carotte : Présence de Pucerons des racines (37). En cas d'observation, appliquez un aphicide en mouillant bien.

Céleri rave : Cas de pourriture molle de la rave (77). Des bactéries pectinolytiques peuvent en être la cause (spécialités cupriques : KOCIDE 101 PM, UMUCUIVRE MICRO ou BOUILLIE BORDELAISE).

Fraise : Beaucoup d'Orius (punaises prédatrices) sont encore en pleine activité. Ne pas multiplier les insecticides dirigés contre les Thrips (37, 41).

Radis : Suivre le développement du Mildiou présent sur cotylédons (Sud de la Seine et Marne). De nombreuses spécialités à base de chlorothalonil sont autorisées, mais attention, le délai avant récolte est de 15 jours.

Poireau : Alternariose présente (toutes parcelles en Loir et Cher).

Rouille en développement (40 % en Indre et Loire).
Mildiou à craindre partout (déjà 20 % en Indre et Loire).